


ATLAS
DE LA
FLORE ALPINE.

Tome. IV.


QK315

.C58

t.4







ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

*Publié par le Club alpin allemand
et autrichien.*

Tome IV (Planches 301 à 400).



GENÈVE & BAILE
LIBRAIRIE GEORG & Co

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.


C. 58
t. 4


Index des planches du tome IV.

(Planches 301 à 400.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

301. *Calluna vulgaris* Salisb.
302. *Erica carnea* L.
303. *Loiseleuria procumbens* Desv.*
304. *Rhododendron Chamæacistus* L.
305. » *hirsutum* L.*
306. » *ferrugineum* L.*
307. *Pyrola uniflora* L.
308. *Armeria alpina* Wild.
309. *Primula Auricula* L.*
310. » *carniolica* Jacq.
311. » *latifolia* Lap.*
312. » *cœnensis* Thom.*
313. » *viscosa* Vill.
314. » *villosa* Jacq.*
315. » *Wulfeniana* Schott.*
316. » *Clusiana* Tausch.*
317. » *glutinosa* Wulf.*
318. » *minima* L.*
319. » *farinosa* L.*
320. » *longiflora* All.*
321. » *elatior* Jacq.*
322. *Androsace Chamaejasme* Host.
323. » *villosa* L.*
324. » *obtusifolia* All.*
325. » *lactea* L.*
326. » *carnea* L.
327. » *vitaliana* Lap.
328. » *Hausmanni* Leyb.
329. » *Helvetica* Gaud.*
330. » *imbricata* Lam.
331. » *glacialis* Hoppe.*
332. *Cortusa Matthioli* L.
333. *Soldanella alpina* L.*
334. » *pusilla* Baumg.*
335. » *minima* Hoppe.*
336. *Cyclamen europæum* L.*
337. *Gentiana Clusii* Perr. et Song.*
338. » *Kochiana* Perr. et » *
339. » *Frœlichii* Jan.*
340. » *frigida* Hænke.*
341. » *lutea* L.
342. » *purpurea* L.
343. » *punctata* L.*
344. » *pannonica* Scop.*
345. » *asclepiadæa* L.*
346. » *prostrata* Hænke.
347. » *utriculosa* L.*
348. » *nivalis* L.
349. » *nana* Wulf.*
350. » *tenella* Rottb.*
351. *Gentiana obtusifolia* Wild.*
352. » *ciliata* L.*
353. » *verna* L.*
354. » *Favrati* Rittener.*
355. » *imbricata* Frœl.*
356. » *bavarica* L.*
357. » *pumila* Jacq.*
358. *Pleurogyne carinthiaca* Gris.
359. *Swertia perennis* L.*
360. *Polemonium cœruleum* L.
361. *Eritrichium nanum* Schrad.*
362. *Pulmonaria styriaca* A. Kern.*
363. *Myosotis alpestris* Schmidt.*
364. *Cerinthe alpina* Kit.
365. *Scopolia carniolica* Jacq.*
366. *Linaria alpina* Mill.*
367. *Scrophularia Hoppei* Koch.*
368. *Digitalis ambigua* Murr.*
369. *Erinus alpinus* L.*
370. *Wulfenia carinthiaca* Jacq.
371. *Pæderota Bona Rota* L.
372. » *Ageria* L.*
373. *Veronica saxatilis* Jacq.*
374. » *fruticulosa* L.*
375. » *alpina* L.
376. » *bellidioides* L.*
377. » *aphylla* L.*
378. » *latifolia* L.
379. *Euphrasia salisburgensis* Funk.*
380. » *minima* Jacq.*
381. *Bartschia alpina* L.*
382. *Rhinanthus lanceolatus* Neilr.*
383. *Pedicularis rosea* Wulf.*
384. » *acaulis* Wulf.
385. » *geminata* Port.
386. » *asplenifolia* Floerke.*
387. » *rostrata* L.
388. » *cæspitosa* Sieb.
389. » *incarnata* Jacq.*
390. » *verticillata* L.*
391. » *recutita* L.
392. » *Oederi* Vahl.
393. » *elongata* A. Kern.*
394. » *foliosa* L.
395. *Melanpyrum silvaticum* L.
396. *Tozzia alpina* L.*
397. *Orobanche flava* Mart.*
398. *Pinguicula vulgaris* L.*
399. » *alpina* L.*
400. *Globularia cordifolia* L.





301. *Calluna vulgaris*, Salisb. — Besenheide.

Bruyère commune. — Common Heath.

Tourbes, landes et pentes arides des Alpes. — Juillet—Octobre.





302. *Erica carnea*, L. — Rosenheide.

Bruyère rose. — Alpine Heath.

Pentes boisées et bords des torrents. Mars — Juin.





303. *Loiseleuria procumbens*, Desv. — Alpenheide.

Azalée des Alpes. — Alpine Azalea.

Pentes arides et sèches des régions supérieures. Juillet — Août.





304. *Rhododendron Chamaecistus*, L. — Zwerg-Alpenrose.

Rosage faux Ciste. — Rockrose flowered *Rhododendron*.

Pentes ombragées de la région alpine et sous alpine dans les Alpes orientales. Juin — Juillet.





305. *Rhododendron hirsutum*, L. — Wimperhaarige Alpenrose.
Rosage cilié. — Ciliate Rhododendron.

Alpes calcaires. Juin — Août.





306. *Rhododendron ferrugineum*, L. — Rostfarbige Alpenrose.

✓ Rosage des Alpes. — Alpine Rhododendron

Alpes, surtout granitiques. Juin — Août.





307. *Pirola uniflora*, L. — Einblüthiges Wintergrün.
Pyrole uniflore. — Oneflowered Wintergreen.

Bois de la région montagneuse. Juin — Juillet.





308. *Armeria alpina*, Willd. — Alpengrasnelke.

Armérie des Alpes. — Alpine Sea Pink.

Pentes gazonnées et ensoleillées des Alpes. Juin — Août.





309. *Primula Auricula*, L. — Aurikel.

Auricule des Alpes. — Alpine Auricule.

Rochers des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.





310. *Primula carniolica*, Jacq. — Krainer Aurikel.

Primevère de Carniole. — Carniolian Primrose.

Fentes des rochers dans les Alpes de Carinthie et Carniole. Mai — Juin.





311. *Primula latifolia*, Lap. — Breitblättrige Primel.
 Primevère à feuilles larges. — Broadleaved Primrose.

Pentes des rochers ardoisières dans le Alpes occidentales et orientales. Juin - Août.





312. *Primula oenensis*, Thom. — Inn-Primel.

Primevère de l'Inn. — Inn's Primula.


Pentes rocheuses et fraîches des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Juillet.





313. *Primula viscosa*, Vill. — Klebrige Primel.
Primevère visqueuse. — Viscous Primula.

Fentes des rochers granitiques des Alpes. Avril—Juillet.





314. *Primula villosa*, Jacq. — Zottige Primel.
 Primevère velue. — Hairy Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Mai—Juin.





315. *Primula Wulfeniana*, Schott. — Wulfen's Primel.

: Primevère de Wulfen. — Wulfen's Primula.

Fentes des rochers calcaires des Alpes orientales dans la région alpine. Juin—Août.





316. *Primula Clusiana*, Tausch. — Clusius' Primel.
Primevère de Clusius. — Clusius' Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales, sur le versant septentrional. Mai — Juillet.





317. *Primula glutinosa*, Wulf. — Blauer Speik.

Primevère glutineuse. — Glutinous Primula.

Alpes granitiques des Alpes orientales dans les rochers de la région alpine. Juin — Août.





318. *Primula minima*, L. — Zwergprimel.

Primevère minime. — Minime Primula.

Pâturages et rochers des Alpes orientales dans la région alpine. Juni — Août.





319. *Primula farinosa*, L. — Mehlprimel.
Primevère farineuse. — Bird's-eye Primrose.


Prairies et pâturages frais des Alpes. Avril — Juin.





320. *Primula longiflora*, All. — Langblumige Primel.
Primevère à longues fleurs. — Longflowered Primrose.

Prairies des Alpes granitiques (disséminé). Juin — Juillet.





321. *Primula elatior*, Jacq. — Hochstengliger Himmelschlüssel.

Primevère inodore. — Oxlip.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai—Juillet.





322. *Androsace Chamaejasme*, Host. — Zwerg-Mannsschild.

Androsace trompeuse. — Ciliated *Androsace*.

Pâturages des Alpes calcaires dans la région alpine. Mai — Août.





323. *Androsace villosa*, L. — Zottiger Mannsschild.

Androsace velue. — Hairy Androsace.


Pâturages rocheux des Alpes occidentales et orientales calcaires, dans la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août.



324. *Androsace obtusifolia*, All. — Stumpfblättriger Mannsschild.

Androsace à feuilles obtuses. — Blunt leaved *Androsace*.

Pâturages et pentes sèches de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





325. *Androsace lactea*, L. — Milchweisser Mannsschild.

Androsace lactée. — Milkwhite Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes calcaires (disséminé). Juin — Août.





326. *Androsace carnea*, L. — Fleischrother Mannsschild.
Androsace carnée. — Flesh coloured *Androsace*.
Pâturages des Alpes granitiques centrales et méridionales. Juillet—Août.





327. *Androsace Vitaliana*, Lap. — Goldprimel.

Androsace jaune. — Yellow *Androsace*.

es occidentales, centrales et tyroliennes sur les pentes arides de la région alpine. Juin — Juillet.






328. *Androsace Hausmanni*, Leyb. — Hausmann's Mannsschild.

Androsace de Haussmann. — Hausmann's *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales (disséminée). Juillet — Aout.





329. *Androsace helvetica*, Gaud. — Schweizer Mannsschild.
Androsace Helvétique. — Swiss *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires de la région alpine. Disséminé. Juillet — Août.





330. *Androsace imbricata*, Lam. — Dachziegelblättriger Mannsschild.

Androsace argentée. — Silverleaved *Androsace*.


Fentes des rochers granitiques et secs de la région alpine (disséminé). Juin — Juillet.



331. *Androsace glacialis*, Hoppe. — Alpen-Mannschild.

Androsace glaciale. — Glacial Androsace.

Moraines et pierriers granitiques des Alpes. Juillet—Août.





332. *Cortusa Matthioli*, L. — Heilglöckchen.

Cortuse de Matthiole. — Alpine Sanicle.

Lieux frais des Alpes occidentales, méridionales et orientales, dans la région sous alpine.
Mai — Juillet.





333. *Soldanella alpina*, L. — Gemeines Alpenglöckchen.
Soldanelle. — Soldanella.


Pentes gazonnées et humides des Alpes. Mai — Août.





334. *Soldanella pusilla*, Baumg. — Kleines Alpenglöckchen.
Petite Soldanelle. — Little Soldanella.

Pâturages frais des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.





35. *Soldanella minima*, Hoppe. — Zwerg-Alpenglöckchen.
 Soldanelle minime. — Minime Soldanella.

Alpes calcaires orientales dans les zones supérieures. Juin — Juillet.





336. *Cyclamen europaeum*, L. — Erdscheibe.
Cyclame d'Europe. — Alpine Sowbread.

Pentes pierreuses des Alpes calcaires dans la région montagneuse. Juillet—Septembre.





337. *Gentiana Clusii* Perr. Song. — Clusius' Enzian.
Gentiane de Clusius. — Clusius's Gentianella.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes. Mai — Août.





338. *Gentiana Kochiana*, Perr. et Song. — Stengelloser Enzian.
Gentiane de Koch. — Gentianelle.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes granitiques. Juin — Juillet.





339. *Gentiana Froelichii*, Jan. — Fröhlich's Enzian.
Gentiane de Froelich. — Froelich's Gentian.
Rochers des zones élevées des Alpes orientales. Août—Septembre.





340. *Gentiana frigida*, Hänke. — Kälteliebender Enzian.
Gentiane des frimas. — Gentian of the cold region.

Alpes granitiques de la Styrie. Juillet — Août.





341. *Gentiana lutea*, L. — Gelber Enzian.
 Gentiane jaune. — Yellow Gentian.
 Montagnes calcaires. Juillet—Août





342. *Gentiana purpurea*, L. — Purpurrother Enzian.
Gentiane pourpre. — Brown Gentian.


habitages de la région alpine et sous alpine dans les Alpes centrales et tyroliennes. Juillet — Août.





343. *Gentiana punctata*, L. -- Punktirter Enzian.
Gentiane ponctuée. — Dotted Gentian.


Pâturages des Alpes dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Août.





344. *Gentiana pannonica*, Scop. --- Pannonischer Enzian.
Gentiane de Hongrie. — Hungarian Gentian.

Pâturages des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Septembre.






345. *Gentiana asclepiadea*, L. — Schwalbenwurz-Enzian.


Gentiane asclépiade — Willow Gentian.

Pentes boisées et humides de la région montagneuse. Août — Septembre.






346. *Gentiana prostrata*, Hänke. — Niedergestreckter Enzian.
 Gentiane couchée. — Prostrate Gentian.
 Gazons des Alpes orientales dans la région alpine. Juillet—Août.





347. *Gentiana utriculosa*, L. — Blasiger Enzian.
Gentiane à calice renflé. — Inflated Gentian.
Prairies humides des Alpes. Juin — Août.





348. *Gentiana nivalis*, L. — Schnee-Enzian.

Gentiane des neiges. — Snow Gentian.

Pentes gazonnées de la région alpine. Juillet—Août.





349. *Gentiana nana*, Wulf. — Zwergenzian.
Gentiane naine. — Dwarf-Gentian.

Moraines glaciaires supérieures des Alpes-tyroliennes. Juillet — Août.





350. *Gentiana tenella* Rottb. — Zarter Enzian.

Gentiane grêle. — Tender Gentian.

Moraines et pentes des régions supérieures. Juillet — Août.





351. *Gentiana obtusifolia*, Willd. — Stumpfblättriger Enzian.
Gentiane aux feuilles obtuses. — Blunt-leaved Gentian.


Prairies et pâturages des Alpes orientales. Juin — Septembre.






352. *Gentiana ciliata*, L. — Gefranster Enzian.
Gentiane ciliée. — Ciliate Gentian.

Pentes arides de la région sous alpine et montagneuse. Septembre — Novembre.





353. *Gentiana verna*, L. — Frühlings-Enzian.
Gentiane printanière ou Oeil de Chat. — Vernal Gentian.
Prairies des Alpes. Mars — Juillet.





354. *Gentiana Favratii*, Rittener. — Kurzlättriger Enzian.

Gentiane de Favrat. — Favrat's Gentian.

Pentes rocheuses des Alpes calcaïres, ici et là, dans la région alpine. Juin — Juillet.





355. *Gentiana imbricata*, Fröl. — Dachziegelblättriger Enzian.
Gentiane à feuilles imbriquées. — Imbricateleaved Gentian.
Pentes fraîches des Alpes orientales dans la zone supérieure. Juillet—Août.





3. *Gentiana bavarica*, L. — Baierischer Enzian
Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.

Gentiana bavarica, L. — Baierischer Enzian. — Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.






357. *Gentiana pumila*, Jacq. — Kleiner Enzian.

Gentiane pumile. — Pumile Gentian.

Pâturages et prairies de la région alpine dans les Alpes orientales. Juin — Août.





358. *Pleurogyne carinthiaca*, Griseb. — Fransenkante.

Pleurogyne. — *Pleurogyne*.

Alpes de Saas de Glaris et de la Carinthie dans les gazons frais de la région alpine et sous alpine.
Juillet — Août





359. *Swertia perennis*, L. — Tarant.

Swertia vivace. — Marsh *Swertia*.

Terrains tourbeux de la région sous alpine et montagneuse. Juillet — Août





360. *Polemonium coeruleum*, L. — Sperrkraut.

Polémoine. — Jacob's Ladder.

Prairies humides des Alpes orientales dans la région montagnarde et sous alpine. Juin—Juillet.





361. *Eritrichium nanum*, Schrad. — Himmelsherold.

Roi des Alpes. — King of the Alps.

Pierriers des hautes altitudes. Juillet—Août.





362. *Pulmonaria styriaca*, A. Kern. — Steierisches Lungenkraut.
Pulmonaire de Styrie. — Styrian Lungwort.

Région boisée des Alpes styriennes. Avril—Juin.






363. *Myosotis alpestris*, Schmidt. — Alpen - Vergissmeinnicht.

Myosotis des Alpes. Alpine Forget-me-not.

Prairies des Alpes. Juin — Septembre.





364. *Cerinthe alpina*, Kit. — Alpen-Wachsblume.
 Mélinet des Alpes. Alpine Honeywort.
 Pâturages rocheux de la région alpine. Juin—Août.





365. *Scopolia carnioica* Jacq. — Scopolie.
Scopoline. — Scopoline.

Pentes boisées des Alpes orientales. Avril—Mai.





366. *Linaria alpina*, Mill. — Alpenleinkraut.
Linaire des Alpes. — Alpine Toad-Flax.
Sables, moraines et pierriers des Alpes. Juin—Octobre.





367. *Scrophularia Hoppei*, Koch. — Hoppe's Braunwurz.

Scrofulaire de Hoppe. Hoppe's Figwort.

Eboulis rocheux de la région subalpine et montagneuse. Juin — Août.





368. *Digitalis ambigua*, Murr. — Gemeiner Fingerhut.

Digitale à grandes fleurs. — Largeflowered Foxglove.

Pentes rocheuses et boisées de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août





369. *Erinus alpinus*, L. — Leberbalsam.

Erine des Alpes. — Wall Erinus.

Rochers des Alpes calcaires. Juin — Août.





370. *Wulfenia carinthiaca*, Jacq. — Wulfenie.
Wulfénie. — Wulfenia.

Alpes de la Carinthie dans la région alpine. Juin — Août.





371. *Paederota Bonarota*, L. f. Manderle.

Boneröte blue. — Blue *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes du Tyrol méridional et de la Styrie. Juin — Juillet.





372. *Paedarota Ageria*, L. — Gelber Ehrenpreis.

Bonerote jaune. — Yellow *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes méridio-orientales. Juin — Août.





373. *Veronica saxatilis*, Jacq. - Blauer Felsehrenpreis.
Véronique saxatile. — Saxatile speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juin—Août.





374. *Veronica fruticulosa*, L. — Rother Felsehrenpreis.

Véronique petit arbuste. — Shrublike Speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juillet—Septembre.






375. *Veronica alpina*, L. — Alpenehrenpreis.

Véronique des Alpes. — Alpine Speedwell.

Région alpine et sous alpine dans les gazons. Juillet—Août.






376. *Veronica bellidioides*, L. — Maassliebchenblättriger Ehrenpreis.
 Véronique à feuilles de Pâquerettes. — Daisylike speedwell.
 Pâturages secs de la région alpine. Juillet—Août.





377. *Veronica aphylla*, L. — Stengelblattloser Ehrenpreis.
Véronique aphyllé. — Aphyllé Speedwell.

Pentes rocheuses et herbeuses des hautes altitudes. Juillet — Août.





378. *Veronica latifolia*, L. — Breitblättriger Ehrenpreis.
Véronique à feuilles larges. — Broadleaved Speedwell.

Région montagneuse et boisée. Juin — Juillet.





379. *Euphrasia salisburgensis*, Funk. — Salzburgischer Augentrost.
 Euphrase de Salzburg. — Eyebright of Salzburg.
 Prairies-et pâturages des Alpes. Août—Septembre.





380. *Euphrasia minima*, Jacq. — Zwerg - Augentrost.
Euphrase naine. — Dwarf Eyebright.

Pâturages des Alpes. Juillet — Septembre.






381. *Bartsia alpina*, L. — Alpenhelm.

Bartsie des Alpes. — Alpine Bartsia.

Prairies rocheuses et pentes arides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





382. *Rhinanthus lanceolatus*, Neilr. — *Alectorolophus-Rhinanthus*.
Cocriste lancéolé. — Lanceolate Rattle.

Prairies des régions inférieures. Juillet — Août.





383. *Pedicularis rosea*, Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.
Pédiculaire rose. — Pink Lousewort.

Alpes occidentales et orientales (rare) dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Aout.





384. *Pedicularis acaulis*, Wulf. — Stengelloses Läusekraut.

Pédiculaire acaule. — Sessile flowered Lousewort.

Alpes méridio-orientales, dans les lieux ombragés de la région alpine et sous alpine. Août — Juin.





385. *Pedicularis geminata*, Port. — Blütenarmes Läusekraut.
Pédiculaire géminée. — Fewflowered Lousewort.

Alpes orientales calcaires dans les pâturages et les escarpements rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





386. *Pedicularis asplenifolia*, Floerke. — Streifenfarnblättriges
Läusekraut.

Pédiculaire à feuilles d'Asplenium. — Asplenium leaved Lousewort.

Alpes granitiques orientales dans la région alpine. Juillet — Août.






387. *Pedicularis rostrata*, L. — Geschnäbeltes Läusekraut.

Pédiculaire à bec crochu. — Crooked Lousewort.

Pentes herbeuses des régions supérieures dans les Alpes. Juillet — Août.





388. *Pedicularis caespitosa*, Sieb. — Rasenbildendes Läusekraut.

Pédiculaire cespiteuse. — Caespituous Lousewort.

Pâturages rocheux de la région alpine dans les Alpes orientales. Juillet — Août.





389. *Pedicularis incarnata*, Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.
Pédiculaire incarnat. — Fleisch coloured Lousewort.
Pâturages de la région alpine dans les Alpes orientales et centrales. Juin — Août.





390. *Pedicularis verticillata*, L. — Quirblättriges Läusekraut.
Pédiculaire en verticille. — Verticillated Lousewort.

Prairies fraîches des Alpes. Juin — Août.





391. *Pedicularis recutita*, L. — Ungeschnäbeltes Läusekraut.
Pédiculaire édentée. — Dissected Lousewort.

Prairies humides des Alpes. — Juillet—Août.





392. *Pedicularis Oederi*, Vahl. — Öder's Läusekraut.

Pédiculaire d'Oeder. — Oeder's Lousewort.

aux humides et rocheux des Alpes septentrionales, piémontaises et autrichiennes. Juillet — Août.





393. *Pedicularis elongata*, A. Kern. — Langtraubiges Läusekraut.
Pédiculaire à grappe allongée. — Longeared Lousewort.
Dolomites et pentes méridionales des Alpes orientales. Juillet — Août.





394. *Pedicularis foliosa*, L. — Blattreiches Läusekraut.

Pédiculaire feuillée. — Strongleaved Lousewort.

Escarpelements herbeux et frais de la région sous-alpine et montagnaise. Juin — Août.





395. *Melampyrum sylvaticum*, L. — Wald-Wachtelweizen.
Mélampyre des forêts. — Wood's Cow Wheat.

Liens boisés et frais des Alpes. Juin — Août





396. *Tozzia alpina*, L. — Alpenrachen.

Tozzie des Alpes. — Alpine Tozzia.

Lièux frais et couverts de la région montagneuse et boisée. Juni — Août.





397. *Orobanche flava*, Mart. — Gelbe Sommerwurz.
Orobanche fauve. — Yellow Broom Rape.

Dans la région montagneuse sur les *Tussilages* et *Adénostyles*. Juin — Juillet.





398. *Pinguicula vulgaris*, L. — Gemeines Fettkraut.
Grassète vulgaire. — Common Butterwort.
Rochers moussus et lieux humides des Alpes. Avril—Juin.





399. *Pinguicula alpina*, L. — Alpen-Ferkraut.
Grassète des Alpes. — Alpine Butterwort.
Lieux humides de la région alpine et sous-alpine. Juin—Août.





400. *Globularia cordifolia*, L. — Herzblättrige Kugelblume.
Globulaire à feuilles en coeur. — Heartleaved Globularia.

Pentes sèches et rocheuses des Alpes. Mai—Août.







New York Botanical Garden Library

QK 315 .C58 v.1 4

Correvon, Henry/Atlas de la flora alpine



3 5185 00108 2484

